

務求出版信用切實保證

又社名醫藥常識報

主特者學識經驗及人格

本報主筆

本報特聘名師法律顧問

辛福報三日刊

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

溫病治法 (十二)

蔣壽卿遺著

太陰陽明合病。有化疹之象。宜以清解透邪法。或用清宣肺胃法。
清解透邪法
連翹四錢 大力子炒枳錢半
運翹五錢 黑山梔三錢
銀石膏五錢 大豆黃卷五錢
桑白皮二錢 滑石通草包五錢
薄荷後入錢半 粉前胡錢半
荊芥一錢 知母錢半 同炒
清宣肺胃法
廣玉金二錢 大力子炒枳二錢
廣玉金二錢 美川連四分
黑梔三錢 粉前胡錢半
大貝母三錢 白蘆仁研後入三分
淨連翹四錢 苦桔梗三分
雞蘇散包四錢 姜竹茹二錢
溫溫一症。最易變端。倘有邪陷化燥。津液耗傷。風動之變。可仿諸溫門中治法損益治之。
秋燥
推六氣之中。燥金主氣。自秋分而至立冬。深秋燥令氣行。人體肺金應之。肌膚乾槁而燥。乃火令無權也。昔人謂燥。
大貝母三錢 白蘆仁研後入三分
淨連翹四錢 苦桔梗三分
雞蘇散包四錢 姜竹茹二錢
溫溫一症。最易變端。倘有邪陷化燥。津液耗傷。風動之變。可仿諸溫門中治法損益治之。
秋燥
推六氣之中。燥金主氣。自秋分而至立冬。深秋燥令氣行。人體肺金應之。肌膚乾槁而燥。乃火令無權也。昔人謂燥。

投稿簡章

- (一) 投寄之稿。不論文言白話。長篇短篇。均所歡迎。惟內容須切實有用。空泛之作。幸勿見賜。
- (二) 經驗良方。以臨症心得。確屬屢試屢效者爲合格。
- (三) 凡驗方之轉錄他書者。須將出處註明。在作者可免抄襲掠美之弊。而讀者亦得由流溯源之益。
- (四) 凡陳陳相因。及在各報已登過之醫方。請勿再投。
- (五) 投寄之稿。望用墨筆繕寫清楚。並須自行圈點。
- (六) 稿末請註明姓名及住址。以便通信。至揭載時如何署名。聽投稿者自定。
- (七) 投寄之稿。揭載與否。本館不能預行聲明。原稿亦概不檢還。惟篇幅較長者。如未揭載。得因豫先聲明寄還原稿。
- (八) 投寄之稿。俟揭載後。分(甲)現金。(乙)書券。(丙)本報。三種酬報。
- (九) 投稿揭載後。其酬報種類及數目。由本館酌定。不豫先面商。若投稿人欲自定者。請於寄稿時聲明。
- (十) 投寄之稿。經揭載後。其著作權歸本館所有。若本館尚未揭載。已先在他處發表者。恕不致酬。
- (十一) 投寄之稿。本館得酌量增刪之。但投稿人不願他人增刪者。可於投稿時豫先聲明。
- (十二) 投稿者請寄海三馬路雲南路角辛福報編輯部收。

楊志一 醫師
朱振聲 醫師

(甲) 特號二元 隨到隨診
(乙) 門診一元 貧病減半
(丙) 出診四元 路途遠加
(丁) 膏丸方四元 次日取件
(戊) 急病隨請隨到

時間
上午九時至十二時
下午二時至六時
診所
上海南京路
電話
三九四三六

啓處號掛

辛福報

總儀署

第三三三號
(日十三月四年十二國民)
分二洋售份每
口路南雲路馬三海上址館
廣告價目
國內每行五字
國外每行十元
代現九五折
廣告價目
國內每行五字
國外每行十元
代現九五折

本期要目

- ▲濕溫傷寒症中西醫診斷之比較
- ▲臨證筆記(一)
- ▲鹿茸治神經衰弱之特效(一)
- ▲經驗良方
- ▲改良煎劑之討論
- ▲溫病治法

內兒科 專家尤學

周醫士診例

時間 上午九時至十二時 下午二時後出診

診金 門診一元。出診四元。膏方四元。丸方四元。通函論症二元。通函處方一元。郵費自理。

診所 上海益湯弄橋北北山西路泰安里第四弄五十八號

中西醫診斷之比較 (葉橘泉)

西醫的診斷。有科學的器械輔助。像「顯微鏡」。「愛克司光」。「體溫計」。「診脈表」。「聽診器」……但是「愛克司光鏡」。「體溫計」。非小範圍的醫院所能辦。非貧平的病家可以用。顯微鏡專門驗細菌。聽診器是聽其音。這是對於診斷上最算的確的了。但是醫生診病。一都要顯微鏡下去驗過。那是手續未免太麻煩了。所以非設備完善的大醫院。又不能辦。「聽診器」可以聽「心」和「肺」的動作。然而動作的太過和不及。又不全關「心」和「肺」自身的理由。「數脈搏」和「量體溫」。都可以器械來幫助。可算最準確沒有誤。例如中年平人。體溫攝氏表爲三十七度。脈搏每分鐘爲七十六至。多則爲熱。少則爲寒。看其似乎一定不易。其實也只得測得其常。不能測其變哩。在下曾診治過一病。是雙林葉家費君友石的哲嗣。年二十餘歲。患的是濕溫伏熱。神昏、發熱、發狂、舌強、舌塞、四肢寒冷、脈搏細遲。每分鐘祇有五十至。熱度低微。攝氏表只有三十四度五。若照西法診斷。脈細遲、無高熱、當然要算心臟衰弱。須用強心藥劑。然而照中醫的診斷。重在搜捕全體證候的主證。最要的主證。當分寒熱、虛、實、表、裏、上、下、的八個大證。脈細遲雖屬「虛」(寒)之證。而細脈緩滑。熱度雖低。舌質厚而燥。且動靜方面觀察得動多靜少。是故確可斷爲實熱證。古人叫做「熱深厥深」。「真寒假寒」。經用承氣湯後。熱結得鬆。脈搏與起。熱度遂升。祇以因結之熱。雖得暢達。而心胃之火大熾。狂躁依然不已。乃再以清心解熱之劑。竹葉石膏、及天王補心丹等。以漸而愈。若根據器械的診斷。而用西法強心。則何異澆油入火。怒馬策鞭。怕不幾幾心腦爆烈嗎?。平心而論。中西各有其長。斷不能以科學的診斷。爲片面之見。而以爲萬能的。(完)

(二)

(楊舒榮)

中節腫硬。漸漸如石如槌。延及兩手食、拇、小指皆如是。而今已潰兩三指。稠水黃。腐薄白。腐搏而難脫。潰者皮色帶紅。不潰者皮色如恆。不但指患。且兩足背亦石硬膨脹。按之骨體有如山之層生。無骨無痛。其爲父母母曾染梅毒之遺傳歟。抑先天稟賦不足。風毒乘襲之痼症耶。余學寡陋。不知其症何名。其源何來。其

治何法。誠所謂不敏自謝也。
余遇類是症者。已有二五。均係幼女。想我中醫界不少宏博之士。未識可不吝而垂教否。
戴君。年祇四十餘。體頗色蒼。猝然少腹脹痛季脅。勢如奔豚。金醫謂寒濕夾滯。用胃苓加枳朮元明粉。一劑泄瀉。轉延李醫。云係腸癰。大劑承氣以攻消。瀉甚。而痛勢不稍殺。遂令診治。

(未完)

[illegible]

鼻流濁涕。腥臭穢黃。宜服下方。養血八兩。研細末。雄豬胆汁和丸。每服五錢。飯後用耆耳子一錢。煎湯送下。倘年久不愈。鼻流膿血水。頭眩虛暈而痛者。必係蝕腦也。名曰控腦砂。宜天羅散治之。方用絲瓜絡近根處者。不計多少。燒存性。研爲末。每服三錢。飢後開水送下。但此症久則必虛。清不升而濁不降。當加補中益氣丸三錢。與天羅散同時服之。

■痔方

痔瘡。因腸中濁垢。不得下達。釀成濕熱。積久發爲痔瘡。宜內外合治。內服用桂圓肉一個。包明礬五分。啣碎開水吞下。七日後用明礬一錢。十四

夫中醫雖無神經之說。而內經於十二經絡之外。有所謂奇經八脈者。其作用不列於藏府形能之範圍。而別具支配。爲人之生命根原者。非西醫所謂腦有神經未梢神經乎。本品能填精壯陽。通補腎氣。功難盡述。故謂治奇經廢弛也可。謂之治神經衰弱。亦無不可也。謂予不信。請舉清濟藥天士醫案以徵之。

(一) 范某稟質不克亢旺。見病已是損法。此寒熱過勞而發。卽內經陽維脈衰。不可維續謹衛。包舉下部無力。有形精血。不得充涵筋骨矣。且下元之損。必累八脈。用鹿茸、杞子、歸身、巴戟、沙苑、茯苓、茴香、羊肉膠丸。

(二) 盧某有行血液。從破傷而損。神氣無以擁護。當此冬令藏陽。陽微畏寒。奇脈少津。乏氣貫布。行步欻然。健忘若憤。何一非精氣內奪之徵。用人參、鹿茸、歸身、杞子、茯苓、沙苑之屬。

綜觀葉氏醫案。一則曰陽維脈衰。不可維續。再則曰行步欻然。健忘若憤。若非神經衰弱。斷無此等形證。而天士屢屢用之。則本品爲治神經衰弱之專劑也。天士早已發明矣。此外如發背疔瘡。坦陷倒靨。元氣危急之候。尤非本品莫救。方書論述甚詳。茲不再贅。

青年一	青年一	青年男	女慾海	之明燈
切疾苦	之慈航	容	略	斑
▲遺精避免法	▲滑精特效方	▲手淫防止法	▲早洩求子法	▲陽痿自療法
▲脫陽急救法	▲夾陰傷寒方			

橫痃內消法	下疳特效藥	防範白濁法	女子夢交方	久渴必止方	久瀉除根方	急性白濁方	王泚治淋方
遺尿經驗方	玉莖攝痛方	楊梅瘰癧方	性慾節制法	楊梅瘋癲方	毒性病療方	急閉打毒方	楊梅結毒方
暈救秘驗方	氣血簡効方	心理治病法	天然養陰法	可寐遊學術	精補種子方	年經早洩方	全書
豐收	少壯耳聾方	病氣筋効方	心然易醫法	可寐遊學術	精補種子方	年經早洩方	全書
豐元	豐元	豐元	豐元	豐元	豐元	豐元	豐元

口外證常識
(二)

（姚夢石）

白鑒二錢。先煮後洗。

口愛情障礙

鼻香惡臭。人之恆情。鼻流濁涕。腥臭異常。愛情之礙。理所必然。挽救之策。其惟保。小程君。平日用培。致患。終日流涕。小說家。其夫人情。春。深。其夫婦心。久。愛。情。破。產。網。愛。情。破。產。者。均無效驗。退求中。友。人。處。見。幸。福。報。二。盒。試。之。果。效。如。荷。初。試。頓。愈。妻。保。想。不。專。治。漏。有。大。洋。五。角。不。折。不。扣。

通經貫絡。或提而出之。或攻而散之。較之服藥。尤有
焉。余曩年笈負曲水。手鐲膏藥方數葉。爲潘氏家祕。
出自經驗。先師申甫公在日。嘗贊賞不置者。其間之八
千抽膏也。聞五十金得之於塘棲某氏。該氏用此膏治手
著名。識者珍之。

〔名稱〕大紅葉應膏

〔效能〕治癰疽疔毒痰癰

〔藥物用量及製法〕

製松香九兩硃砂三兩樟腦六兩兒茶乳香沒藥血竭各六錢黃
麻子一百廿粒四六片元寸各三錢

先將草麻肉打爛。松陽根樟乳沒兒茶。均各切末。經
緩加入。搗極透。再加冰射。打勻成膏

用法 隔水燉化攤貼

〔名稱〕烏龍膏

〔效能〕治一切無名腫毒。初起能消。已成尤可引膿外潰

〔藥品用量及製法〕

陳白粉(四兩炒研)老薑末姜半夏(各三錢)枯礬(四錢)白占
(二兩)熔化用陳米醋調成膏。老嫩得宜。(未完)

改良煎劑之討論

（楊贊民）

送下赤石脂末。此其變通之法也。如旋覆代
赭湯。其代赭石一味。不宜於提煉膏精亦須
研極細末。而以調和之藥汁送下了
按以上所舉數例。用藥轉變之法。不外乎此
。其或例中有未及者。可以類推也。

我國藥物。本自有種種製法。計有浸炒。蒸
炮。洗。炙。煨。燻。諸術。蓋用酒用蜜。皆取
其宜。以土以鹽。各收其效。本草所謂酒漬
升提。姜製溫散。入鹽走腎而軟堅。用醋洗
肝而收斂。蜜便除劣性而降下。米泔去燥性
而和中。乳潤枯結血。蜜甘益緩元。陳璧士
藉土氣以補中州。麵麴麴製。抑酸性勿傷
上脘。黑豆甘草湯漬。咸解毒致令中和。羊

酥豬脂塗燒，並移骨容易脫斷。去積者免服。去心者除煩。此製治各有所宜也。張隱菴所謂附子目炮，助其熱也。製若九日炒，助其燥也。製黃連以水浸，助其寒也。……足見製法既殊，則不但功效迥別，且能使補偏救弊之力更大。故於提煉膏精之先，務必將該藥若者當酒漬。若者當土炒。若者水浸……先依法製治後，然後提煉之。實多一番手續。切勿因陋就簡，致失中藥之神妙而損中藥之價值也。

雖然，泡製手續，固不獲免，而亦不無變通之處。余可以無言乎。凡泡製者，所以使兩種性質混合也。故製大黃以酒，則酒之性質，與大黃互相混合。而大黃之性，遂可上至巔頂，而不僅局於下行。炙鼈甲以醋，則醋之性質與鼈甲互相混合。而鼈甲之性，遂可約之直達病所。